

## 人類乳頭瘤狀病毒疫苗

### 甚麼是人類乳頭瘤狀病毒？

人類乳頭瘤狀病毒（HPV）是一組包括 100 多種類型的病毒，其中約 40 種會感染人類的生殖器官。HPV 是一種非常常見的傳染病，主要是透過親密的皮膚接觸及性接觸而傳播，大部份受感染的患者都沒有任何病徵，感染病毒後身體亦會自行清除，但若未能清除病毒而持續感染，便有機會變成子宮頸癌。

有些人類乳頭瘤狀病毒被列為「高風險病毒類型」，此病毒類型會產生不正常的病變稱為子宮頸上皮內瘤(CIN)，如沒有得到適合的治療，便有可能引致子宮頸癌，約七成的子宮頸癌是因 HPV16 型和 18 型感染而引致的；而其他的會被稱為「低風險病毒類型」，此病毒類型則與性病疣有關。現時，人類乳頭瘤狀病毒感染被認為是導致子宮頸癌的必須但並非唯一的因素。

### 疫苗簡介

現時香港有兩種認可疫苗，分別為加衛苗和卉妍康，兩種均能預防 HPV16 和 HPV18 所引致的子宮頸癌。

	加衛苗 HPV 疫苗		卉妍康 HPV 疫苗	
適合年齡	9 – 14 歲	15 歲以上	9 – 14 歲	15 歲以上
建議接種時間*	0, 6 個月	0, 2, 6 個月	0, 6 個月	0, 1, 6 個月
預防疾病				
- 子宮頸癌	✓		✓	
- 外陰癌	✓		✓	
- 陰道癌	✓		✓	
- 生殖器宮濕疣	✓		✗	

\* 接種時間具靈活性，如有需要，請向醫護人員查詢。

### 疫苗的安全性

世界衛生組織已認可兩種 HPV 疫苗的安全性，兩種都不含病毒基因或任何具傳染性物質，亦不會引致 HPV 病毒感染或相關疾病。

兩種疫苗常見的副作用(如注射部位疼痛、腫脹、紅斑、瘙癢、瘀傷及發燒)均屬輕微。接種疫苗後，通常會建議逗留 15 分鐘接受觀察。

## 誰不適合接種疫苗？

1. 現正懷孕及計劃在六個月內懷孕的婦女
2. 對疫苗的成份敏感
3. 哺乳的婦女接種前可向醫生查詢

資料由仁安醫院提供

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

